


Esta hoja es usada como ayuda educativa y puede que no proporcione toda la información que usted necesita.

-
- ◆ Siga las instrucciones específicas de su médico.
 - ◆ Si olvida tomar una dosis, póngase en contacto con su médico y/o farmacista.
 - ◆ Informe a su médico de todas las medicinas (sin receta médica y prescripciones) que usted toma actualmente.

Uso indicado: Antibiótico



Este folleto se le proporciona por un esfuerzo conjunto de los Departamentos de Farmacia, Nutrición, Enfermería y Educación.



Centro Médico de la Universidad de Mississippi
2500 North State Street
Jackson, MS 39216-4505
Teléfono (601) 984-1000

Interacción de las medicinas con la comida

Quinolonas



- ◆ Cipro (ciprofloxacina)
 - ◆ Levaquin (levofloxacina)
 - ◆ Maxaquin (lomefloxacina)
 - ◆ Tequin (gatifloxacina)
 - ◆ Avelox (moxifloxacina)
 - ◆ Floxin (ofloxacina)
 - ◆ Noroxin (norfloxacina)
-

Efectos Secundarios Comunes

- ◆ Molestia en el Estómago
 - ◆ Diarrea
 - ◆ Náusea o Vomito
 - ◆ Sensibilidad a la luz
 - ◆ Insomnio
 - ◆ Cambios en el azucar de la sangre (especialmente en diadetes)
-

Esta medicina debe ser tomada con un vaso completo de agua (8 onzas) y con el estómago vacío.



Interacciones Potenciales de la Medicina y los Alimentos:

- ◆ Tome la medicación con un vaso completo de agua (8 onzas) y con el estómago vacío. 1 hora antes o 2 horas después de las comidas.
- ◆ Durante 1 o 2 horas después que usted tome esta medicación no debe tomar leche u otros productos lácteos, antiácidos, Carafate (sucralfate), multivitamínicos o preparaciones que contengan hierro, zinc, calcio o magnesio. (Estos productos impiden que la medicina trabaje correctamente)

Ejemplos de los Productos que deben EVITARSE cuando toma esta medicación:



Leche o productos lácteos



Antiácidos



Multivitamínicos